

ZANZARE

SUGGERIMENTI
PER EVITARNE
LA DIFFUSIONE

Le zanzare rivestono una grande importanza per la loro capacità di trasmettere molte malattie sia dell'uomo sia degli animali quali encefaliti (tra cui la malattia West Nile), Dengue, Chikungunya, Malaria, Febbre Gialla, Filari del cane.

Sino a pochi anni fa tali malattie erano diffuse quasi esclusivamente in aree tropicali e subtropicali, ma con l'incremento dei viaggi all'estero alcune di tali infezioni sono oggi possibili anche nel nostro Paese.



ANOFELE

Attività massima al crepuscolo. Vettore classico della malaria. Sverna (diapausa invernale) in cantine e stalle.



CULEX PAPIENS

Attività massima la notte. Vettrice della filaria del cane.



AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE)

Attività massima al tramonto e all'alba, ma anche di giorno (in zone ombrose) e di notte (con una fonte luminosa). Vettrice di malattie virali (West Nile, Chikungunya, Febbre Gialla, ecc.).

IN ORTI E GIARDINI

- > **coprire** con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese, tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua piovana da irrigazione (cisterne, secchi, annaffiatoi, bidoni e bacinelle)
- > **non far ristagnare** acqua all'interno dei sottovasi e, se possibile, eliminarli.

IN CORTILI E CONDOMINI

- > **pulire** un paio di volte all'anno tombini e pozzetti
- > applicare una **zanzariera** a maglia fine sopra il tombino per impedire alle zanzare di deporvi le uova
- > durante la stagione umida, trattare ogni 15 giorni circa con prodotti larvicidi i **tombini** e le zone di scolo e ristagno
- > verificare che le **grondaie** siano pulite e non ostruite.

NEI CIMITERI

- > introdurre il prodotto larvicida nei **vasi** di fiori freschi o sostituirli con fiori secchi o di plastica.

NEGLI ABBEVERATOI DI ANIMALI

- > cambiare quotidianamente l'acqua e lavarli con cura.

IN PRIMAVERA E NEI MESI PIÙ CALDI

- > è utile effettuare trattamenti **larvicidi** nelle aree umide come fognature, luoghi di ristagno e raccolta acqua piovana, ecc.

ALL'APERTO

- > non accumulare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante (disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e coprirli con un telo). Per i materiali che non possono essere coperti, effettuare idonea **disinfestazione** entro 5 giorni dopo la pioggia
- > non lasciare che l'acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiali
- > **non abbandonare** oggetti e/o contenitori che possono raccogliere e trattenere acqua piovana (ad esempio secchi o piscine gonfiabili).



Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio Igiene Sanità Pubblica
e Prevenzione ambienti di vita
Como, via Castelnovo 1
tel. 031 370421 fax 031 370425
prevenzione.medica@asl.como.it
in collaborazione con
Dipartimento di Prevenzione Veterinario

Regione
Lombardia

ASL Como

Per maggiori informazioni
www.asl.como.it